

Acabas de completar un **test de riesgo sobre la leishmaniosis**. Cuantas más opciones hayas señalado, **más riesgo** tiene tu mascota de **contrar la leishmaniosis canina**. Para prevenirla, puedes seguir leyendo esta guía y convertirte en un experto en la materia.



- Empezamos esta guía para la protección con un test. Es tan sencillo como marcar las casillas que correspondan.
- Paseo con mi perro a partir del anochecer
  - Cuando hace calor, prefiero que mi perro esté fresco fuera de casa
  - Mi perro duerme fuera de casa
  - No utilizo productos antiparasitarios para mi perro
  - Vivo en España

## Cuidados y prevención frente a la leishmaniosis canina

### 5 cosas que hay que saber sobre la leishmaniosis

- 1 La leishmaniosis canina es **una grave enfermedad** que se transmite por unos pequeños insectos llamados **flebotomos**, activos **entre el anochecer y el amanecer**, desde finales de la **primavera hasta el otoño**, principalmente en zonas mediterráneas.
- 2 **Una simple picadura es suficiente** para transmitir la leishmania (el parásito que causa la leishmaniosis), aunque se pueden llegar a producir hasta 100 picaduras por hora.
- 3 El flebotomo hembra inyecta el parásito al picar, dejando sólo una lesión en la piel. Los **perros infectados actúan como una fuente de infección** para otros insectos y animales.
- 4 Durante la incubación, los **parásitos se multiplican** en la piel, la sangre y los órganos internos.
- 5 Los primeros **síntomas** son la alopecia y las llagas (en cabeza y patas). Si no se tratan, pueden aparecer otros como pérdida de peso y del apetito, hemorragia nasal y sobrecrecimiento de las uñas, antes de la muerte del animal, provocada por un fallo renal.



Al igual que tu perro sabe lo que necesitas, tú sabes lo que necesita tu perro, por eso protégelo todo el año con el único collar indicado frente a la leishmaniosis, Scalbor.

Gracias a su avanzada tecnología, proporciona una **liberación constante de deltametrina** desde el collar a la piel del perro, como consecuencia del roce con el cuello. Es plenamente eficaz después de una semana y produce un efecto repelente y antialimentario frente al flebotomo. Un pequeño gesto que os convertirá en los perfectos cómplices.



### Conviértete en un perfecto cómplice


### Consejos para proteger a tu perro

- ▶ Limita los paseos nocturnos con tu perro en primavera y verano.
- ▶ Evita que pase muchas horas fuera de casa en las épocas de más calor.
- ▶ Permítele dormir dentro de casa durante la noche.
- ▶ Coloca mosquiteras de malla fina para evitar que el flebotomo entre en casa.
- ▶ Protégelo frente al flebotomo con productos específicos.

### Consulta el mapa sobre la incidencia de la leishmaniosis.

#### Mapa España

Prevalencia de la leishmaniosis según la zona geográfica en España



Fuente: Current situation of Leishmania infantum infection in shelter dogs in northern Spain, Miró et al. Parasites & Vectors 2012 5:60.